

ARACHNIDES RECUEILLIS AU COURS DE LA MISSION DE MM. J. BONNIER  
ET CH. PEREZ AU GOLFE PERSIQUE (MARS-AVRIL 1901),

PAR M. E. SIMON.

1. LATRODECTUS HASSELTII INDICUS E. Simon, in *Bull. Mus. Hist. nat.*, 1897, p. 97.

Dibba, côte d'Arabie, entre Mascate et le détroit d'Ormuz; île Arzana, îlot au S.-O. de Bahrein.

Cette variété du *L. Hasselti* Thorell est connue de Mascate, de Kurachee, de Bombay, de Poona.

2. ARGIOPE LORDI O. P. Cambridge, in *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1870, p. 870, pl. L, fig. 1.

Dibba.

Découvert à Massaua; très répandu en Éthiopie et dans le sud de l'Arabie.

3. CYRTOPHORA CITRICOLA Forsköl.

Dibba.

Espèce répandue dans la région méditerranéenne australe, l'Afrique tropicale et australe, à Madagascar, dans l'Inde, à Ceylan, en Birmanie et en Australie.

4. ARANEUS THEISI Walckenaer.

Dibba.

Répandu dans presque toutes les régions tropicales du monde.

5. **Thomisus Bonnier** sp. nov.

♀ Long. 7 millim. — Cephalothorax vix longior quam latior, laevis, setis rigidis minutissimis, in regione clypei densioribus, parce conspersus, fronte sat angusta, utrinque producta sat longe et oblique turbinata, pallide luteus, regione oculorum albo-opaca, linea transversa, inter tubercula ducta, fulvo-rufula et postice utrinque, sub oculo laterali, macula parva nigrina notata. Oculi cuncti parvi et inter se subaequales, ut in *T. daradiodi* ordinati. Abdomen magnum, antice rotundum, postice valde ampliatus et truncatus, albo-opacum, postice utrinque ad angulum puncto nigro notatum. Chelae, partes oris, pedesque pallide lutea, tibiis quatuor anticis macula nigra subtus in parte apicali, metatarsis annulo lato subapicali nigro, tarsis annulo medio fusco-rufulo ornatis, femore 1<sup>i</sup> parvis aculeis parvis quatuor uniseriatis ad radicem minute nigro-notatis, tibia aculeis longioribus pellucidibus, extus 4 (3<sup>o</sup> reliquis longiore) intus 2 minoribus subapicalibus, metatarso aculeis similibus 5-5, subtus armatis. Plaga genitalis parva, simplex, rufula.

Dibba.

Assez voisin du *T. daradioides* E. Sim., du Yemen, dont il diffère surtout par ses pattes antérieures annelées et tachées de noir, par ses métatarses antérieurs n'offrant en dessous que cinq paires d'épines, tandis que ceux du *T. daradioides* en offrent sept paires.

6. *SELENOPS RADIATA* Latreille.

Ile Arzana.

Répandu dans une grande partie de l'Afrique et de l'Asie.

***Cercetius* nov. gen.**

Nov. gen. inter *Cerbalum* et *Sparassum*, a *Cerbalo* differt cephalothorace antice attenuato, oculis mediis anticis lateralibus paulo minoribus, a sese quam a lateralibus paulo remotioribus, et area oculorum mediorum (longiore quam latiore) postice quam antice evidenter latiore, a *Sparasso* differt oculis mediis anticis lateralibus paulo minoribus et praesertim oculorum linea postica leviter recurva, a *Noniano*, cui sat affine est, differt oculis posticis in lineam recurvam et margine inferiore chelarum dentibus principalibus trinis armato.

NOTA. — Indépendamment de ses rapports avec les *Sparassus*, *Cerbalus* et *Nonians* du groupe des *Sparasseae*, le nouveau genre *Cercetius* offre aussi des analogies avec les genres *Polystes* et *Polystodes* (Pocock), notamment par son groupe oculaire plus long que large, ses yeux médians antérieurs plus petits (beaucoup moins que ceux des *Polystes*) que les médians, et l'armature de la marge inférieure de ses chélicères; d'un autre côté il s'en éloigne, pour se rapprocher des *Sparassus*, par sa seconde ligne oculaire beaucoup plus large relativement à la première avec les yeux latéraux plus gros que les médians.

7. ***Cercetius Perezi* sp. nov.**

♀ (pullus) long. 15 mill. Cephalothorax paulo longior quam lator, leviter convexus, antice attenuatus, fulvus, crebre et longe albo-sericeo-pubescent et antice setis nigris longis conspersus. Abdomen breviter ovatum, supra albo-sericeo-pubescent et lineolis nigris flexuosis et interruptis nigris ornatum, subtus regione epigasteris lutea, regione ventrali nigerrima. Mamillae nigrae. Chelae robustissimae, valde convexae, fusco-rufulae, albido-pilosae et parce nigro-crinatae, margine inferiore sulci dentibus trinis validis (medio paulo longiore) dentique ultimo minutissimo, armato. Partes oris, sternum, coxaeque nigerrima. Pedes longi, lutei, femoribus ad apicem, tibiis ad basin subtus nigro-notatis, tarsis metatarsisque usque ad basin crebre nigro-scopulatis, aculeis numerosis, ut in *Sparasso* ordinatis, armati.

Dibba.

8. *EVIPPA PRAELONGIPES* O. P. Cambridge.

*Lycosa praelongipes* O. P. Cambr., in *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1870, p. 822, pl. L, f. 2.

Dibba.

Commun dans la région de la mer Rouge.

9. BUTHUS EUPEUS C. Koch.

*Androctonus Eupeus* C. Koch, *Ar.*, v, 1839, p. 127, f. 419.

*Buthus Eupeus* Kraepelin, *d. Tierr. Scorp. E.*, 1899, p. 23.

Dibba.

Espèce répandue dans la région transcaspienne, le Turkestan et l'Afghanistan.

10. NEBO HIERICHONTICUS E. Simon.

*Hemiscorpion hierichonticus* E. Sim., in *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1872, p. 255.

*Diplocentrus sulcatus* Karsch, in *Mitt. Münch. ent. Ver.*, III, 1879, p. 99.

*Nebo hierichonticus* Kraepelin, *d. Tierr., Scorp.*, 1899, p. 98.

Dibba.

Connu de Syrie et du Yemen.

11. GALEODES CASPIUS Birula. — Birula, in *Zool. Anz.*, XIII, 1890, p. 205. — Kraepelin, *d. Tierr.*, XII, Palp. et Solif., 1901, p. 16.

Dibba.

Le *Galeodes caspius*, indiqué de la région transcaucasique, de l'Asie Mineure et de la Perse, m'était jusqu'ici inconnu en nature, aussi la détermination des individus recueillis à Dibba est-elle un peu douteuse. Ils correspondent bien aux descriptions des auteurs et diffèrent des *G. Cyrus* et *Darius*, décrits par Pocock (*Ann. Mag. Nat. hist.* (6), XVI, 1895, p. 79.) de Fao sur le golfe Persique, par le dernier article de leur tarse de la quatrième paire dépourvu d'épines en dessous.

---

DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DU GENRE HETEROPANOPE STIMPSON,  
PROVENANT DE LA CÔTE D'IVOIRE, HETEROPANOPE AFRICANA N. SP.

PAR J.-G. DE MAN.

Cette espèce a été découverte à San Pedro, Côte d'Ivoire, par M. Thoiré, qui en a enrichi les collections du Muséum. Elle est représentée par quatre exemplaires : deux femelles de taille moyenne et deux mâles dont l'un est probablement adulte. On la trouve dans les marigots, c'est-à-dire dans des lagunes en communication avec la mer.

Autant que je sache, le genre *Heteropanope* Stimps., dont les espèces habitent la région Indopacifique, n'avait pas encore été observé sur la côte occidentale de l'Afrique. Ce joli petit Crabe présente des affinités assez grandes avec la *Heteropanope indica* de Man des îles Mergui (DE MAN, *Jour-*